Eksempel 8 side 577 i E&P er feil: Eksemplet ser på de to kurvene $r = 1+\sin\theta$ og $r^2 = 4\sin\theta$.

Nøkkelen til å forstå hva som skjer er at forskjellige (r,θ)-verdier godt kan gi samme punkt i planet. Så betrakt et punkt på den første kurven, med polarkoordinater (r_1,θ_1), og et punkt på den andre kurven, med polarkoordinater (r_2,θ_2):

$$r_1 = 1+\sin\theta_1, \quad r_2^2 = 4\sin\theta_2.$$

Disse gir samme punkt i planet akkurat når en av de følgende tre betingelser er oppfylt:

1. $r_1 = r_2 = 0$ (da er verdiene av θ_1 og θ_2 irrelevante, så lenge ligningene er oppfylt),
2. $r_1 = r_2$ og $\theta_1 = \theta_2 + 2k\pi$ for et heltall k,
3. $r_1 = -r_2$ og $\theta_1 = \theta_2 + (2k+1)\pi$ for et heltall k.

Ved å betrakte tilfelle 2, slik boka gjør, finner vi skjæringspunktet merket A i figuren.

Vi sjekker tilfelle 1, og finner vi at punktet O (origo) er på begge kurvene: $\theta_1 = \frac{3}{2}\pi$ og $\theta_2 = 0$ gir $r_1 = r_2 = 0$.

For tilfelle 3 er det ikke nødvendig å sjekke *alle* heltall k, siden begge kurvene er slik at å legge et helt multiplum av 2π til θ ikke endrer r, og dermed gir samme punkt. Så vi kan nøye oss med å se på tilfellet $r_1 = -r_2$, $\theta_1 = \theta_2 + \pi$. Det gir $\sin\theta_2 = -\sin\theta_1$, og dermed kan vi skrive

$$\begin{aligned}
r_1^2 &= r_2^2 \\
(1+\sin\theta_1)^2 &= -4\sin\theta_1 \\
1+2\sin\theta_1+\sin^2\theta_1 &= -4\sin\theta_1 \\
1+6\sin\theta_1+\sin^2\theta_1 &= 0 \\
\sin\theta_1 &= \frac{1}{2}\big(-6\pm\sqrt{6^2-4}\big) = -3\pm 2\sqrt{2}.
\end{aligned}$$

Siden $|\sin\theta_1| \le 1$ kan vi ikke bruke minustegnet, så vi ender med

$$\sin\theta_1 = 2\sqrt{2}-3 \approx -0.171573$$

Dette gir de to løsningene merket B og C i figuren. En løsning er $\theta_{1,1} \approx -0.172 \approx -9.9^\circ$, den andre løsningen er $\theta_{1,2} = \pi - \theta_{1,1} \approx 189.9^\circ$.