

# Egenskaper ved integralet

$$\blacksquare \int_a^b c \, dx = c(b - a)$$

$$\blacksquare \int_a^b c f(x) \, dx = c \int_a^b f(x) \, dx$$

$$\blacksquare \int_a^b (f(x) + g(x)) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$$

$$\blacksquare \int_a^b f(x) \, dx + \int_b^c f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx$$

Matematikk 1 2002-09-16 – p.2/7

## Egenskaper (forts)

$\blacksquare$  Om  $a < b$  og  $f(x) \geq 0$  på  $[a, b]$  er

$$\int_a^b f(x) \, dx \geq 0$$

$\blacksquare$  Om  $a < b$  og  $f(x) \leq g(x)$  på  $[a, b]$  er

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx$$

Endelig vil vi kreve av integralet at **enhver kontinuerlig funksjon definert på et lukket intervall er integrerbar.**

Matematikk 1 2002-09-16 – p.3/7

# Fundamentalteoremet

Hvis  $f$  er kontinuertlig på  $[a, b]$ , må

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(\xi) d\xi = f(x)$$

for alle  $x \in [a, b]$ .

Konsekvens av dette:

Dersom  $F$  er en antiderivert til  $f$ , er

$$\int_a^b f(\xi) d\xi = F(b) - F(a)$$

## Partisjoner og Riemannsummer

**Partisjon**  $P$  av  $[a, b]$ :

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b.$$

Notasjon:  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ,  $|P| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$ .

**Riemannsum**  $R$  assosiert med  $P$ :

$$R = \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i$$

hvor  $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$  for  $i = 1, 2, \dots, n$  (**punktvalg**).

# Integrerbarhet

Integrerbarhet for en funksjon  $f$  over et intervall  $[a, b]$ :  $f$  kalles **integrerbar** med **integral**  $I$  dersom: For enhver  $\epsilon > 0$  finnes  $\delta > 0$  slik at for enhver partisjon  $P$  av  $[a, b]$  med  $|P| < \delta$  og enhver Riemannsum  $R$  assosiert med  $P$  er

$$|R - I| < \epsilon.$$

**Notasjon**

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

# Riemannintegralet

Integralet vi nettopp har definert, kalles **Riemannintegralet**.

Det oppfyller aksiomene vi stilte opp, og derfor også **fundamentalteoremet**.