LØSNINGSFORSLAG TIL SIF5005, 14. MAI, 2001

Oppgave 1. A: (vi). B: (ii)

Oppgave 2. Vi skal maksimere funksjonen $f(x,y,z) = xyz$ under bibetingelsen

$$g(x,y,z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Lagrange' multiplikatormetode gir ligningssystemet

$$\nabla f(x,y,z) = \lambda \cdot \nabla g(x,y,z) \qquad \text{og} \quad g(x,y,z) = 1.$$

Det vil si,

$$\begin{aligned}
&(1) \quad yz = \lambda \cdot \frac{2x}{a^2} \\
&(2) \quad xz = \lambda \cdot \frac{2y}{b^2} \\
&(3) \quad xy = \lambda \cdot \frac{2z}{c^2} \\
&(4) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1
\end{aligned}$$

Det er klart at maksimum må inntreffe i et punkt der $x \neq 0$, $y \neq 0$ og $z \neq 0$. Vi kan derfor multiplisere ligningene (1) - (3) med henholdsvis x, y og z. Det gir

$$xyz = \lambda \cdot \frac{2x^2}{a^2} = \lambda \cdot \frac{2y^2}{b^2} = \lambda \cdot \frac{2z^2}{c^2}$$

slik at $\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$. Innsatt i (4) gir det $3 \cdot \frac{x^2}{a^2} = 1$ slik at $x = \pm a/\sqrt{3}$, $y = \pm b/\sqrt{3}$ og $z = \pm c/\sqrt{3}$. Maksimum for $f(x,y,z)$ er derfor $\frac{a}{\sqrt{3}} \cdot \frac{b}{\sqrt{3}} \cdot \frac{c}{\sqrt{3}} = \frac{abc}{3\sqrt{3}}$ (og minimum er $-\frac{abc}{3\sqrt{3}}$).

Oppgave 3. Ved kjerneregelen (kjederegelen) gjelder

$$\begin{aligned}
\frac{dT}{dt} &= \frac{\partial T}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial T}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{\partial T}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dt} = \left\langle \frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y}, \frac{\partial T}{\partial z} \right\rangle \cdot \left\langle \frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right\rangle \\
&= \langle 2, 1, -4 \rangle \cdot \frac{\langle 7, 5, 1 \rangle}{|\langle 7, 5, 1 \rangle|} \cdot 1000 \ {}^\circ\mathrm{C/h} = \frac{14 + 5 - 4}{\sqrt{49 + 25 + 1}} \cdot \frac{1000}{60} \ {}^\circ\mathrm{C/min} = \frac{50}{\sqrt{3}} \ {}^\circ\mathrm{C/min}.
\end{aligned}$$

Oppgave 4. La $f(x,y,z) = xz^2 - yz + \cos xy$. Da er

$$\vec{N}(x,y,z) = \nabla f(x,y,z) = \langle z^2 - y \sin xy, \ -z - x \sin xy, \ 2xz - y \rangle$$

en normalvektor til S i punktet (x,y,z). Spesielt er

$$\vec{N}(0,0,1) = \langle 1, -1, 0 \rangle.$$

Punktet $(0,0,1)$ ligger både på flaten S $\quad (f(0,0,1)=1)$ og på den gitte kurven $(t=1)$. Tangentvektor til kurven i $(0,0,1)$ er $\vec{r}\,'(1)$ der $\vec{r}(t)=\langle \ln t,\, t\ln t,\, t\rangle$. Det vil si

$$\vec{r}\,'(1)=\langle \frac{1}{t},\, \ln t+1,\, 1\rangle\Big|_{t=1}=\langle 1,1,1\rangle.$$

Siden $\vec{N}(0,0,1)\cdot\vec{r}\,'(1)=\langle 1,-1,0\rangle\cdot\langle 1,1,1\rangle=0$, er $\vec{N}(0,0,1)$ en normalvektor til tangenten til kurven i $(0,0,1)$. Derfor ligger tangenten til kurven i normalplanet til flaten S.

Oppgave 5.

a). Kirkerommets volum

$$\begin{aligned} V &= \iint_{x^2+y^2\le 18^2}\left(20-\frac{x^2}{25}+\frac{y}{2}\right)\,dA \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^{18}\left(20-\frac{r^2\cos^2\theta}{25}+\frac{r\sin\theta}{2}\right)r\,dr\,d\theta = 5430.24\,\pi. \end{aligned}$$

b). La $f(x,y)=20-x^2/25+y/2$, slik at taket til kirken er som en del av grafen til f. Da gir $|\nabla f(x,y)|$ den maksimale retningsderiverte i punktet (x,y). Vi har

$$\begin{aligned} \nabla f(x,y) &= \langle -\frac{2x}{25},\, \frac{1}{2}\rangle \\ |\nabla f(x,y)| &= \sqrt{(\frac{2x}{25})^2+(\frac{1}{2})^2} \le \sqrt{(\frac{2\cdot 20}{25})^2+(\frac{1}{2})^2}=\sqrt{2.81} \end{aligned}$$

for $x^2+y^2\le 400=20^2$. Siden $\tan 60^\circ=\sqrt{3}>\sqrt{2.81}$, er helningen på taket alltid mindre enn 60° med horisontalplanet. Altså kan takbelegget benyttes.

Oppgave 6. Vi legger T inn i et koordinatsysten slik at z–aksen følger symmetriaksen i T og xy–planet ligger i skjøten mellom del A og B. Da kan T beskrives i sylinderkoordinater ved

$$-\sqrt{4-r^2}\le z\le 4-2r \qquad \text{for } 0\le r\le 2,\quad 0\le\theta\le 2\pi$$

med massetetthet

$$\delta(r,\theta,z)=\begin{cases} 1/3 & \text{for } z>0, \\ 4/3 & \text{for } z<0. \end{cases}$$

Massen til T er

$$m=\left(\frac{1}{3}\pi\cdot 2^2\cdot 4\right)\cdot\frac{1}{3}+\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}\pi\cdot 2^3\right)\cdot\frac{4}{3}=\frac{80\pi}{9}.$$

På grunn av symmetrien ligger tyngdepunktet $(\overline{x},\overline{y},\overline{z})$ til T på z–aksen. Det vil si, $\overline{x}=0$, $\overline{y}=0$ og

$$\begin{aligned} \overline{z} &= \frac{1}{m}\iiint_T z\cdot\delta\cdot dV = \frac{9}{80\pi}\Big\{\int_0^{2\pi}\int_0^2\int_{-\sqrt{4-r^2}}^0 z\cdot\frac{4}{3}\cdot r\,dz\,dr\,d\theta \\ &\quad +\int_0^{2\pi}\int_0^2\int_0^{4-2r} z\cdot\frac{1}{3}\cdot r\,dz\,dr\,d\theta\Big\} = -\frac{2}{5}. \end{aligned}$$

Avstanden mellom P og tyngdepunktet er derfor $4 + 2/5 = 22/5$.

Oppgave 7.
a).

$$\begin{aligned}\operatorname{div}\vec{F} &= \frac{\partial}{\partial x}(2x + \cos yz) + \frac{\partial}{\partial y}(-\arctan y) + \frac{\partial}{\partial z}\left(1 + \frac{z}{1+y^2}\right)\\ &= 2 - \frac{1}{1+y^2} + \frac{1}{1+y^2} = 2.\end{aligned}$$

b). S er gitt ved $z = e^{1-x^2-y^2} - 1$ for $x^2 + y^2 \leq 1$. Sammen med flaten S_B: $z = 0$ for $x^2 + y^2 \leq 1$ danner den en enkel lukket flate. Ifølge divergensteoremet gjelder derfor

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n}\, dS + \iint_{S_B} \vec{F} \cdot (-\vec{k}) dA = \iiint_T \operatorname{div}\vec{F}\, dV,$$

der T er området innenfor den lukkede flaten. Det vil si,

$$\begin{aligned}\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n}\, dS &= \int_0^{2\pi}\int_0^1\int_0^{e^{1-r^2}-1} 2 \cdot r\, dz\, dr\, d\theta - \iint_{x^2+y^2\leq 1} -(1+0) dA\\ &= 2\pi \int_0^1 2r(e^{1-r^2} - 1) dr + (\text{arealet av } \ S_B) = \pi(2e - 3).\end{aligned}$$

Oppgave 8. Flaten S har en rand som består av 4 glatte deler:

$$\begin{aligned}C_1 &: \quad x = t, \quad y = 0, \quad z = 0, \quad 0 \leq t \leq 1,\\ C_2 &: \quad x = \cos\theta, \quad y = \sin\theta, \quad z = \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,\\ C_3 &: \quad x = 1 - t, \quad y = 0, \quad z = 2\pi, \quad 0 \leq t \leq 1,\\ C_4 &: \quad x = 0, \quad y = 0, \quad z = 2\pi - t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.\end{aligned}$$

La $P(x,y,z) = z$, $Q(x,y,z) = x^4 y$ og $R(x,y,z) = 1 - x^2 - y^2$ betgne koordinatene til $\vec{G}$. Ifølge Stokes' teorem gjelder

$$\begin{aligned}\iint_S \operatorname{curl}\vec{G} \cdot \vec{n}\, dS &= \int_{C_1} \vec{G} \cdot \vec{T}\, ds + \int_{C_2} \vec{G} \cdot \vec{T}\, ds + \int_{C_3} \vec{G} \cdot \vec{T}\, ds + \int_{C_4} \vec{G} \cdot \vec{T}\, ds\\ &= \int_{C_1} P\, dx + \int_{C_2} P\, dx + Q\, dy + R\, dz + \int_{C_3} P\, dx + \int_{C_4} R\, dz\\ &= \int_0^1 0\, dt + \int_0^{2\pi} \{\theta(-\sin\theta) + \cos^4\theta \sin\theta\cos\theta + 0\} d\theta + \int_0^1 2\pi(-dt) + \int_0^{2\pi} 1(-dt)\\ &= \left[-\sin\theta + \theta\cos\theta - \frac{\cos^6\theta}{6}\right]_0^{2\pi} - 2\pi - 2\pi = -2\pi.\end{aligned}$$