

# Litt topologi i euklidske rom

Harald Hanche-Olsen

hanche@imf.unit.no

**Sammendrag.** Dette notatet inneholder en kort innføring i topologi i euklidske rom, med vekt på kompaktet. Om du ønsker en noe dypere innføring som anvender metriske rom kan du se i et notat laget for 75042 Partielle differensialligninger høsten 1996, som finnes i

<http://www.math.ntnu.no/~hanche/kurs/pde/1996h/analysis.html>

## Innledning og notasjon

Dette avsnittet oppsummerer notasjon og resultater om åpne og lukkede mengder som antas kjent.

Mengden av reelle tall skrives  $\mathbb{R}$  og det Euklidske  $n$ -dimensjonale rommet  $\mathbb{R}^n$  består av alle  $n$ -tupler  $x = (x_1, \dots, x_n)$  der  $x_j \in \mathbb{R}$  for  $j = 1, \dots, n$ .

Den viktigste topologiske egenskapen til  $\mathbb{R}$ , som skiller  $\mathbb{R}$  fra mengden  $\mathbb{Q}$  av rasjonale tall, er eksistensen av *supremum* og *infimum* til begrensede mengder: Om  $A$  er en begrenset delmengde av  $\mathbb{R}$  finnes et *minste* tall  $M \in \mathbb{R}$  med egenskapen  $a \leq M$  for alle  $a \in A$ . Dette tallet er  $\sup A$ . Tilsvarende defineres  $\inf A$  som det *største* tallet  $m$  med egenskapen  $a \geq m$  for alle  $a \in A$ .

Merk at det finnes ikke noe *rasjonalt* tall som er et supremum for  $\{a \in \mathbb{Q} : a^2 < 2\}$ .

En delmengde  $V \subseteq \mathbb{R}^n$  kalles *åpen* dersom det, for hver  $x \in V$  finnes en  $\varepsilon > 0$  slik at for hver  $y \in \mathbb{R}^n$  med  $|y - x| < \varepsilon$  er  $y \in V$ .

Vi skriver  $B_\varepsilon(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < \varepsilon\}$  og kaller dette den åpne  $\varepsilon$ -omegnen om  $x$  (eller  $\varepsilon$ -ballen om  $x$ , hvorav bokstaven  $B$ ).

Med andre ord er  $V$  åpen hvis og bare hvis den inneholder en  $\varepsilon$ -omegn om ethvert av sine punkter. En omegn om  $x$  er simpelthen en mengde som inneholder en  $\varepsilon$ -omegn om  $x$ , og en åpen mengde er derfor en mengde som er en omegn om alle sine punkter.

Et punkt  $x$  sies å tilhøre *tillukningen* av en mengde  $F \subseteq \mathbb{R}^n$  dersom enhver omegn om  $x$  har ikketomt snitt med  $F$ . En annen måte å si det på er at, for enhver  $\varepsilon > 0$  finnes  $y \in F$  med  $|y - x| < \varepsilon$ . En tredje formulering er at det finnes en følge i  $F$  som konvergerer mot  $x$ . Vi skriver  $\bar{F}$  for tillukningen til  $F$ .

En delmengde  $F \subseteq \mathbb{R}^n$  kalles *lukket* dersom den er sin egen tillukning. Ekvivalent er at komplementet  $\mathbb{R}^n \setminus F$  er åpen.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> $A \sim B = \{x \in A : x \notin B\}$  er den mengdeteoretiske differensen mellom  $A$  og  $B$ . Det er kanskje mer vanlig å skrive  $A \setminus B$ , men jeg følger notasjonen til Perko her.

Den *lukkede*  $\varepsilon$ -omegnen  $\bar{B}_\varepsilon(x) = \{y : |y - x| \leq \varepsilon\}$  kommer også til nytte iblant.

## Kompaktet

Lukkede begrensede delmengder av  $\mathbb{R}^n$  og deres egenskaper er viktige i mange sammenhenger. Det er mange ekvivalente karakteriseringer av lukkede begrensede delmengder. Vi skal se på de viktigste.

**Snittegenskaper.** En mengde  $\mathcal{F}$  av delmengder av  $\mathbb{R}^n$  sies å ha *endelig snittegenskap* dersom enhver endelig delmengde av  $\mathcal{F}$  har ikketomt snitt, det vil si

$$F_1, F_2, \dots, F_k \in \mathcal{F} \Rightarrow F_1 \cap F_2 \cap \dots \cap F_k \neq \emptyset.$$

Her er noen eksempler.

- (a)  $\mathcal{F} = \{[x, \infty) : x \in \mathbb{R}\}$
- (b)  $\mathcal{F} = \{[-\varepsilon, \varepsilon] : \varepsilon > 0\}$
- (c)  $\mathcal{F} = \{\{x \in \mathbb{Q} : |x^2 - 2| \leq 1/k\} : k = 1, 2, \dots\}$

Vi skriver

$$\bigcap \mathcal{F} = \{x : x \in F \text{ for minst en } F \in \mathcal{F}\}$$

for snittet av alle mengder i  $\mathcal{F}$ , og merker oss at  $\bigcap \mathcal{F} = \emptyset$  i tilfellene (a) og (c) ovenfor, men  $\bigcap \mathcal{F} = \{0\}$  i tilfelle (b).

$\mathcal{F}$  sies å ha endelig snittegenskap *relativt* til en mengde  $K \subset \mathbb{R}^n$  dersom  $\{K \cap F : F \in \mathcal{F}\}$  har endelig snittegenskap.

**1 Definisjon.**  $K \subseteq \mathbb{R}^n$  kalles *kompakt* om, hver gang  $\mathcal{F}$  er en mengde av lukkede delmengder av  $\mathbb{R}^n$  med endelig snittegenskap relativt til  $K$ , gjelder  $K \cap \bigcap \mathcal{F} \neq \emptyset$ .

**2 Teorem.** *En delmengde av  $\mathbb{R}^n$  er kompakt hvis og bare hvis den er lukket og begrenset.*

**Bevis:** Vi viser først at om  $K \subseteq \mathbb{R}^n$  ikke er lukket, er  $K$  ikke kompakt. Anta  $x \in \bar{K}$  men  $x \notin K$ . La så

$$\mathcal{F} = \{\bar{B}_\varepsilon(x) : \varepsilon > 0\}$$

så er det ikke vanskelig å se at  $\mathcal{F}$  har endelig snittegenskap relativt til  $K$ , men  $K \cap \bigcap \mathcal{F} = \emptyset$ , så  $K$  er ikke kompakt.

At en ubegrenset mengde heller ikke er kompakt vises tilsvarende ved å velge

$$\mathcal{F} = \{\mathbb{R}^n \sim B_r(x) : r > 0\}.$$

Vi antar nå at  $K \subset \mathbb{R}^2$  er lukket og begrenset, og skal vise at  $K$  er kompakt. (Vi begrenser oss til tilfellet  $n = 2$  for å holde notasjonen enkel. Det burde være opplagt hvordan beviset generaliseres til  $K \subset \mathbb{R}^n$  for vilkårlig  $n$ .)

Siden  $K$  er begrenset finnes  $a_0, b_0, c_0$  og  $d_0$  slik at  $K \subseteq [a_0, b_0] \times [c_0, d_0]$ . Vi skal bestemme  $a_j \leq b_j, c_j \leq d_j$  med  $a_0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots, b_0 \geq b_1 \geq b_2 \geq \dots, c_0 \leq c_1 \leq c_2 \leq \dots$  og  $d_0 \geq d_1 \geq d_2 \geq \dots$  slik at

$$K_j = ([a_j, b_j] \times [c_j, d_j]) \cap K \neq \emptyset$$

og slik at  $\mathcal{F}$  har endelig snittegenskap relativt til  $K_j$ . Om vi har gjort dette for en gitt  $j \geq 0$  setter vi  $e_j = (a_j + b_j)/2$  og  $f_j = (c_j + d_j)/2$  og legger merke til at

$$K_j = \underbrace{([a_j, e_j] \times [c_j, f_j]) \cap K}_{(*)} \cup \underbrace{([a_j, e_j] \times [f_j, d_j]) \cap K}_{(*)} \cup \underbrace{([e_j, b_j] \times [c_j, f_j]) \cap K}_{(*)} \cup \underbrace{([e_j, b_j] \times [f_j, d_j]) \cap K}_{(*)}$$

slik at  $\mathcal{F}$  må ha endelig snittegenskap relativt til minst en av disse fire mengdene.<sup>2</sup> Vi lar  $K_{j+1}$  være en av disse. Om vi for eksempel valgte den merket  $(*)$  ovenfor, setter vi da  $a_{j+1} = e_j, b_{j+1} = b_j, c_{j+1} = c_j$  og  $d_{j+1} = d_j$ .

Siden  $a_0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots$  og denne følgen er begrenset, finnes  $a = \sup\{a_0, a_1, \dots\}$  og det er lett å se at  $a_k \rightarrow a$  når  $j \rightarrow \infty$ . Tilsvarende eksisterer  $b = \lim b_j, c = \lim c_j$  og  $d = \lim d_j$ . Men fordi  $b_j - a_j = 2^{-j}(b_0 - a_0)$  er  $b = a$ , og tilsvarende er  $d = c$ .

Gitt  $\varepsilon > 0$  vil  $K_j \subset B_\varepsilon(a, b)$  for alle store nok  $j$ . Lar vi  $z_j \in K_j$  for alle  $j$  vil derfor  $z_j \rightarrow (a, b)$ . Siden  $K$  er lukket er derfor  $(a, b) \in K$ . La nå  $F \in \mathcal{F}$ . Så er  $F \cap K_j \neq \emptyset$ , og dermed er  $F \cap B_\varepsilon(a, b) \neq \emptyset$ . Siden dette gjelder alle  $\varepsilon > 0$  og  $F$  er lukket er  $(a, b) \in F$ . Dermed er  $(a, b) \in \bigcap \mathcal{F}$ , og vi har vist at  $K \cap \bigcap \mathcal{F} \neq \emptyset$ . Dette viser at  $K$  er kompakt, og avslutter beviset. ■

**Konvergente delfølger.** En følge  $(y_j)$  kalles en *delfølge* av en følge  $(x_k)$  dersom det finnes indekser  $k_1 < k_2 < k_3 < \dots$  slik at  $y_j = x_{k_j}$  for alle  $j$ .

**3 Teorem.** En delmengde  $K \subseteq \mathbb{R}^n$  er kompakt hvis og bare hvis enhver følge i  $K$  har en delfølge som konvergerer mot et punkt i  $K$ .

<sup>2</sup>Om vi arbeider i  $\mathbb{R}^n$  må vi dele  $K_j$  i  $2^n$  deler ved å splitte på midten i hver av den  $n$  koordinatene.

**Bevis:** Anta først at  $K$  er kompakt, og la  $(x_k)$  være en følge i  $K$ . La

$$F_k = \overline{\{x_k, x_{k+1}, \dots\}} \quad (k = 1, 2, 3, \dots).$$

Siden  $K$  er kompakt finnes  $z \in K \cap \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$ . La  $\varepsilon_j > 0$  og  $\varepsilon_j \rightarrow 0$  når  $j \rightarrow \infty$ . Siden  $z \in F_1$  finnes  $k_1$  med  $|z - x_{k_1}| < \varepsilon_1$ . Om vi har valgt  $k_1 < k_2 < \dots < k_j$ , bruker vi det faktum at  $z \in F_{k_j+1}$  til å finne  $k_{j+1} > k_j$  med  $|z - x_{k_{j+1}}| < \varepsilon_{j+1}$ . Det er nå ganske klart at  $x_{k_j} \rightarrow z$ ; det vil si at  $(x_k)$  har en delfølge som konvergerer mot  $z$ . Siden  $K$  er kompakt er  $K$  lukket, og dermed er  $z \in K$ .

Omvendingen er lett å vise: Om  $K$  ikke er kompakt finnes en følge i  $K$  som konvergerer mot et punkt utenfor  $K$  (om  $K$  ikke er lukket) eller mot uendelig (om  $K$  ikke er begrenset). I begge tilfeller vil ingen delfølge konvergere mot et punkt i  $K$ . ■

**Overdekninger.** En *åpen overdekning* for en mengde  $K \subseteq \mathbb{R}^n$  er en mengde  $\mathcal{U}$  av åpne delmengder av  $\mathbb{R}^n$  slik at  $K \subseteq \bigcup \mathcal{U}$ . Unionen av  $\mathcal{U}$  er definert ved

$$\bigcup \mathcal{U} = \{x \in \mathbb{R}^n : \text{det finnes } U \in \mathcal{U} \text{ slik at } x \in U\}.$$

En *underoverdekning* er en delmengde av  $\mathcal{U}$  som også er en overdekning for  $K$ , og en slik underoverdekning kalles *endelig* om den har endelig mange medlemmer.<sup>3</sup>

**4 Teorem.** En delmengde av  $\mathbb{R}^n$  er kompakt hvis og bare hvis enhver åpen overdekning av mengden inneholder en endelig underoverdekning.

**Bevis:** Jeg har mest lyst til å overlate beviset til leseren. Til en samling  $\mathcal{U}$  av åpne mengder kan man lage en samling lukkede mengder ved å ta komplementer:

$$\mathcal{F} = \{\mathbb{R}^n \sim U : U \in \mathcal{U}\}$$

og det viser seg at  $\mathcal{U}$  er en åpen overdekning av  $K$  hvis og bare hvis  $K \cap \bigcap \mathcal{F} = \emptyset$ , og  $\mathcal{U}$  har en endelig underoverdekning hvis og bare hvis  $\mathcal{F}$  ikke har endelig snittegenskap relativt til  $K$ .

Da tror jeg det er trygt å overlate detaljene til leseren. ■

## Anvendelser av kompakthet

Kontinuerlige funksjoner på kompakte mengder er begrensede og uniformt kontinuerte, og rommet av alle slike funksjoner er komplett.

<sup>3</sup>Overrasket?

**5 Proposisjon.** *Et kontinuerlig bilde av en kompakt mengde er kompakt.*

Med andre ord: Om  $K \subseteq \mathbb{R}^n$  er kompakt og  $f: K \rightarrow \mathbb{R}^m$  er kontinuerlig er  $f(K) = \{f(x) : x \in K\}$  også kompakt.

**Bevis:** La  $\mathcal{F}$  være en mengde lukkede delmengder av  $\mathbb{R}^m$  som har endelig snittegenskap relativt til  $f(K)$ . La  $\mathcal{E} = \{f^{-1}(F) : F \in \mathcal{F}\}$ .<sup>4</sup> Da vil  $\mathcal{E}$  bestå av lukkede delmengder av  $K$  med endelig snittegenskap, og har derfor ikke-tomt snitt siden  $K$  er kompakt. La  $x \in \bigcap \mathcal{E}$ , så er  $f(x) \in \bigcap \mathcal{F}$ . Dette viser kompakthet av  $f(K)$ . ■

**6 Korollar.** *En kontinuerlig funksjon definert på en kompakt mengde er begrenset. Om funksjonen har reelle verdier vil den anta sin maksimumsverdi og minimumsverdi i  $K$ .*

**Bevis:** Den første delen følger fordi en kompakt mengde er begrenset. Den andre delen følger fordi  $f(K)$  blir en lukket begrenset delmengde av  $\mathbb{R}$ , og da er  $\sup f(K) \in f(K)$  og  $\inf f(K) \in f(K)$ . ■

En funksjon  $f$  kalles *uniformt kontinuerlig* om det for hver  $\varepsilon > 0$  finnes en  $\delta > 0$  slik at for alle  $x, y$  i definisjonsområdet til  $f$  gjelder

$$|y - x| < \delta \Rightarrow |f(y) - f(x)| < \varepsilon.$$

Dette impliserer at  $f$  er kontinuerlig, men er ikke ekvivalent: Kontinuitet krever bare at det gitt  $x$  og  $\varepsilon > 0$  skal finnes en  $\delta > 0$  slik at implikasjonen over holder for alle  $y$ . Forskjellen er at uniform kontinuitet krever at *samme*  $\delta$  skal kunne brukes uavhengig av  $x$ . Som en øvelse kan du vise at funksjonen  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  gitt ved  $f(x) = x^2$  ikke er uniformt kontinuerlig.

**7 Proposisjon.** *En kontinuerlig funksjon definert på en kompakt mengde er uniformt kontinuerlig.*

**Bevis:** La  $\varepsilon > 0$ . For hver  $x \in K$  finnes  $\delta(x) > 0$  slik at

$$|y - x| < 2\delta(x) \Rightarrow |f(y) - f(x)| < \varepsilon.$$

Kompaktheten gir oss at det finnes  $x_1, \dots, x_p \in K$  slik at

$$K \subseteq B_{\delta(x_1)}(x_1) \cup \dots \cup B_{\delta(x_p)}(x_p).$$

<sup>4</sup>Her er  $f^{-1}(F) = \{x \in K : f(x) \in F\}$ . Du bør overbevise deg om at  $f^{-1}(F)$  er lukket dersom  $f$  er kontinuerlig og  $F$  er lukket.

La nå  $\delta = \min(\delta(x_1), \dots, \delta(x_p))$  og anta  $y, z \in K$  med  $|y - z| < \delta$ . Det finnes da en  $j$  med  $|y - x_j| < \delta(x_j)$ . Så er også  $|z - x_j| < |z - y| + |y - x_j| \delta + \delta(x_j) \leq 2\delta(x_j)$ , og derfor er

$$|f(y) - f(z)| < |f(y) - f(x_j)| + |f(x_j) - f(z)| < 2\varepsilon$$

som viser at  $f$  er uniformt kontinuerlig.<sup>5</sup> ■

## Kompletthet

En følge  $(x_k)$  i  $\mathbb{R}^n$  kalles en *Cauchy-følge* dersom det, for enhver  $\varepsilon > 0$ , finnes  $N$  slik at  $|x_k - x_m| < \varepsilon$  hver gang  $m, k > N$ . Du bør overbevise deg selv om at enhver konvergent følge er en Cauchy-følge. Et rom hvor det omvendte holder, altså der enhver Cauchy-følge er konvergent, kalles *komplett*.

**8 Teorem.**  $\mathbb{R}^n$  er komplett.

**Bevis:** La  $(x_k)$  være en Cauchy-følge. Man ser raskt at følgen må være begrenset, og derfor finnes en konvergent delfølge — la oss si  $y_j = x_{k_j} \rightarrow z$ . La  $\varepsilon > 0$ , og bestem  $N$  som i definisjonen ovenfor. Samtidig finnes det  $M$  slik at  $|y_j - z| < \varepsilon$  hver gang  $j > M$ . Dersom nå  $m > N$  og vi velger  $j > M$  slik at  $k_j > N$ , blir  $|x_m - z| \leq |x_m - y_j| + |y_j - z| < 2\varepsilon$ , og derfor vil  $x_m \rightarrow z$ . ■

**Rommet av kontinuerlige funksjoner.** La  $K \subset \mathbb{R}^n$  være kompakt. Vi skriver  $C(K, \mathbb{R}^m)$  for vektorrommet bestående av alle kontinuerlige funksjoner  $K \rightarrow \mathbb{R}^m$ , og forsyner dette rommet med *maksimumsnormen*

$$\|u\| = \max_{x \in K} |u(x)|.$$

Også om  $K$  ikke er kompakt, kan vi betrakte rommet av alle *begrensede*, kontinuerlige funksjoner  $K \rightarrow \mathbb{R}^m$ . Vi skriver  $C_b(K, \mathbb{R}^m)$  for dette rommet, og ser at  $C_b(K, \mathbb{R}^m) = C(K, \mathbb{R}^m)$  dersom  $K$  er kompakt.

**9 Proposisjon.** *Om  $K \subseteq \mathbb{R}^n$  er  $C_b(K, \mathbb{R}^m)$  komplett.*

<sup>5</sup>Kanskje plager det deg at vi endte med ulikheten  $\dots < 2\varepsilon$  når definisjonen krever  $< \varepsilon$ ? Men dette er ikke noe problem. Vi kunne bare justert definisjonen av  $\delta(x)$  slik at vi får  $|y - x| < 2\delta(x) \Rightarrow |f(y) - f(x)| < \varepsilon/2$ . Men denne slags trivialiteter tilfører ikke beviset noe vesentlig, så jeg pleier unngå dem. Bruken av  $2\delta(x)$  i beviset er derimot vesentlig for at det skal fungere.

**Bevis:** La  $(u_k)$  være en Cauchy-følge i  $C_b(K, \mathbb{R}^m)$ . For hver  $x \in K$  ser vi at  $(u_k(x))$  er en Cauchy-følge i  $\mathbb{R}^m$ , og  $u(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} u_k(x)$  eksisterer derfor. Vi må bare vise at  $u$  er kontinuerlig og at  $\|u_k - u\| \rightarrow 0$ .

La nå  $\varepsilon > 0$  og velg  $N$  slik at  $\|u_k - u_m\| < \varepsilon$  når  $k, m > N$ . Dette betyr at  $|u_k(x) - u_m(x)| < \varepsilon$  for alle  $x \in K$  når  $k, m > N$ . Vi lar  $m \rightarrow \infty$  og konkluderer at  $|u_k(x) - u(x)| \leq \varepsilon$  for alle  $k > N$ . Dette er *uniform konvergens*, og brukes til å vise det vi trenger: La  $x \in K$  og  $\varepsilon > 0$ , og velg  $N$  som før. La  $k > N$  og velg  $\delta > 0$  slik at om  $|y - x| < \delta$  er  $|u_k(y) - u_k(x)| < \varepsilon$ . For en slik  $y$  blir da

$$|u(y) - u(x)| \leq |u(y) - u_k(y)| + |u_k(y) - u_k(x)| + |u_k(x) - u(x)| < 3\varepsilon$$

som viser kontinuiteten av  $u$ . Estimatet  $\|u_k - u\| \leq \varepsilon$  har vi allerede bevist. ■